

ОВИЛАК

Схема выпойки ягнят

170 г ОВИЛАК на 1 л воды

Возраст ягнёнка	Выпоек в сутки	Объём за выпойку	Молочного напитка в сутки	ОВИЛАК, г/сут*
0–1 сутки	—	—	Молозиво	—
2–3 сутки	5	150 мл	750 мл	~120 г
4–7 сутки	4	200–250 мл	800–1000 мл	~130–160 г
8–14 сутки	4	300 мл	1200 мл	~190 г
15–21 сутки	3	400 мл	1200 мл	~190 г
22–35 сутки	3	450–500 мл	1350–1500 мл	~215–240 г
36–42 сутки	2	400–500 мл	800–1000 мл	~130–160 г
Далее	—	—	Постепенный отъём	—

* Примечание: при разведении 170 г порошка в 1 л воды итоговый объём молочного напитка будет больше 1 л, поэтому количество сухого ОВИЛАК в таблице указано ориентировочно.

Приготовление и выпойка

Растворить 170 г ОВИЛАК в 1 литре чистой тёплой воды.

Температура воды для смешивания — ориентировочно 40–45 °С; температура выпойки — около 38–40 °С.

Сохранять одинаковую концентрацию смеси на протяжении молочного периода. Перед отъёмом снижать количество и кратность выпоек, а не разбавлять продукт.

Первые сутки жизни ягнёнок должен получать молозиво. ОВИЛАК не заменяет молозивную выпойку.

Сухой корм и отъём

С 3–5-го дня предлагать ОВИСТАРТ небольшими свежими порциями. Чистая вода должна быть постоянно доступна; хорошее сено вводить постепенно.

Ориентир для отъёма: возраст около 5–6 недель и устойчивое потребление ОВИСТАРТ примерно 250 г/гол./сут в течение нескольких дней при хорошем состоянии и нормальном росте ягнёнка.